

Los CDC anuncian la reducción de los períodos de cuarentena por el COVID-19

El KDHE adopta la directriz de los CDC con modificaciones

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) sigue recomendando una cuarentena de 14 días después de la exposición al COVID-19, ya que el período de incubación de esta enfermedad es de 14 días. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron una directriz modificada que permite períodos de cuarentena más cortos para aumentar el cumplimiento de la cuarentena y el número de personas que se someten a las pruebas. Los departamentos de salud locales pueden elegir seguir esta directriz. Para obtener información en su condado, comuníquese con su departamento de salud local.

Cómo funciona el período reducido

(Consulte con su departamento de salud local para obtener información específica de su comunidad)

7 días de cuarentena (incluye la prueba y ausencia de síntomas)

- Después de la exposición, debe controlar diariamente sus síntomas o participar en el control de Salud Pública durante 7 días.
- Si no tiene síntomas durante este tiempo, a partir del día 6 puede hacerse una prueba de PCR (las pruebas de antígenos y anticuerpos NO están permitidas para este fin).
- Si el resultado es negativo y usted sigue sin síntomas, puede dejar la cuarentena después de que pasen 7 días completos, a partir del día 8.
- Si el resultado de la prueba está pendiente, debe esperar hasta que reciba los resultados.

10 días de cuarentena (sin la prueba y sin síntomas)

- Después de la exposición, debe controlar diariamente sus síntomas o participar en el control de Salud Pública durante 10 días.
- Si no tiene síntomas durante los 10 días, puede dejar la cuarentena sin hacerse una prueba el día 11.

El KDHE recomienda que todas las personas expuestas se controlen durante catorce (14) días después de la exposición y se comuniquen con el proveedor de atención médica si comienzan a tener síntomas. La enfermedad puede aparecer hasta el día 14.

Quiénes no son elegibles para la reducción de la cuarentena:

- Residentes de centros de atención de largo plazo y de vida asistida
- Poblaciones de delincuentes de las prisiones del Departamento de Correcciones

Cuándo es preferible no acortar la cuarentena:

- Se recomienda que los contactos cercanos de casos infectados con variantes del virus SARS-CoV-2 que se sabe que son más infecciosos cumplan la cuarentena completa de 14 días.

